

肉羊几种常见胃部疾病的防治

岳普湖县农业农村局也克先拜巴扎镇畜牧兽医站 努尔艾力·乌布力喀斯木

摘要: 肉羊在实际养殖过程中会出现各类病害,影响其正常生长以及育肥,胃病是肉羊疾病中较为常见的疾病类型,本文主要从肉羊养殖中较为发生率较高的三类胃部疾病进行了分析,分别为羊急性瘤胃臌气、羊前胃弛缓以及羊创伤性网胃腹膜炎,分别就各类疾病的病因症状以及预防治疗措施进行了相应的分析,以期能够为肉羊养殖工作中胃病的防治提供部分参考。

关键词: 肉羊;胃部疾病;防治

肉羊在养殖过程中胃病疾病的发生率较高,其症状多为消化功能紊乱、食欲降低、绝食、反刍无力等,患病之后肉羊的正常生长发育以及繁殖能力会受到严重的影响,肉羊胃部疾病会随着其喂养方法的调整,喂养饲料的更换以及天气状况的变化而发病,在不同胃部疾病的处理中,采取的方式也有不同,需要做好各类胃部系统疾病的预防以及紧急救治,确保饲养疾病的康复。

一、羊急性瘤胃臌气

羊急性瘤胃臌气的发生原因,主要是讲在日常饮食中使用了大量的易发酵饲料,此类饲料大量使用之后,会在其瘤胃中产生大量的气体,从而导致出现瘤胃臌气情况,此类疾病大多发生于春末夏初放牧的羊群,且绵羊的发生率较山羊相比较。

(一) 病因与症状

羊急性瘤胃臌气发病前主要是由于羊使用了霜冻饲料、幼嫩的紫花苜蓿或者霉变的饲料,部分羊会因为现实中过度抢食或使用经饲料量过多,导致患羊患病之后最为明显的表现为不时精神不安、腹部膨大、嗝气翻出、停止,左肋窝向外明显凸出及触诊左侧腹部紧张性有明显增加,扣音呈鼓音听诊,可见其瘤胃蠕动音明显减弱,部分患羊会出现视黏膜发绀、呼吸困难、心率加快等情况,如未能及时进行处理,可能会导致其出现呼吸困难,甚至心脏停搏等情况严重,威胁着肉羊的生命安全。

(二) 预防

针对此类情况在养殖过程中需要加强对其饲养管理,饲喂青草或者放牧之前一周需要通过青干草的饲喂,以避免快速的饲喂调整,导致羊只出现过食的情况,切不可在有冰霜或者畜牧木素地进行放牧,需要加强对肉羊各类草料的管理以及合理储藏,避免其出现霉变的情况,每次肉羊在实际饲喂时不可在短时间内饲喂过多的精饲料,此类疾病在实际治疗时,需要尽可能在短时间内对其瘤胃内的气体进行快速排除,避免食物的继续发酵,可通过穿刺放气的方式进行处理,穿刺放气部位主要为左肋部位,可使用兽用16号针头进行放气,放气以及拔针时均需要对其腹壁进行按压,确保其腹壁与瘤胃壁之间紧挨在一起,以避免胃内物进入到腹腔内部,导致出现腹膜炎的感染情况。

二、羊前胃弛缓

(一) 病因与症状

羊前胃弛缓的发生原因主要是由于饲喂不合理所致,其患病之后前胃的收缩力以及兴奋性会有明显的降低,患羊的主要症状为反刍时障碍,前胃的蠕动力量有明显减轻,如甚至出现蠕动停止的情况,随着疾病的逐渐发展会出现继发性中毒症状。

(二) 预防

羊前胃弛缓患病的发生主要是由于其饲喂管理不当饲料,单一长时间饲喂消化难度较大的饲料所致,但是如长时间未羊进行定量的饲喂或者其运动不足,食用了缺乏矿物质的饲料就会导致其出现消化功能紊乱情况,胃部的收缩能力会有明显降低,另外瘤胃臌气、胃肠道炎以及瘤胃积食也会导致出现继发性前胃弛缓,肉羊出现继发性前胃弛缓时期,胃内的食物聚集量会有明显增加,出现不同程度的瘤胃扩张情况,食欲会有明显下降,反刍停止,瘤胃部的动力会有明显减弱,而瘤胃内容物的发酵会导致出现大量气体,患羊会出现左腹增大,触诊感不坚实的情况,羊前胃弛缓,发病时其整体精神状态会有明显下降起,倦怠无力,

反刍缓慢,食欲降低,胃流动蠕动力会有明显减少,如患羊属于继发性前胃弛缓,其会在保留其原有病症的基础上加重消化功能障碍的情况。

羊前胃弛缓在实际预防时需要加强对其饲养管理消除病因,在实际治疗时需根据其患病原因进行相应的处理,如其为过失所致,可通过饥饿疗法进行缓解,禁食2~3天之后,通过易消化饲料的供应,促进其胃肠道功能的逐步恢复,如患羊的症状较为严重,可以使用泻剂对肠道进行清理,可使用硫酸镁等进行处理,以提升其胃肠道的蠕动速度,在实际治疗中需要注意,如患羊为继发性前胃弛缓,在缓解期前胃迟缓的同时,还需要对其原发性疾病进行治疗,从而达到根除的效果。

三、羊创伤性网胃腹膜炎

(一) 病因与症状

羊创伤性网胃腹膜炎的发生原因主要是由于羊食用过过于尖锐的异物导致对其胃部产生损伤刺激异物,随食物进入到其网胃内之后,会刺入临近膈肌的网胃壁,如严重情况下会导致穿透其膈肌的程度,甚至刺入心包内部,导致出现腹膜炎,网胃炎甚至心包炎等导致患病的羊只出现消化系统功能障碍以及心脏系统疾病的情况,此类胃病大多出现在牛类养殖中,但是山羊以及其他反刍动物也有可能发生,出现此类病变的患羊初步症状主要为食欲下降,反刍减少等情况,部分羊会有前期胃迟缓症状,随着其患病情况的不断加重,其起卧以及排便时可能会出现呻吟以及磨牙等疼痛表现,部分患羊会出现体温升高情况,如其异物刺入到细胞内部,会导致其全身症状恶化精神状态下降,体温急剧升高,肌肉颤动。

(二) 预防

羊创伤性网胃腹膜炎,在实际治疗中需要加强对其预防管理,需做好羊舍的清洁以及管理,避免有异物混入到羊舍内部,导致羊出现误食的情况,如羊出现患病之后需要及时将异物取出,大多通过手术的方式进行取物同时需要进行抗生素的应用,以提升其康复情况。

四、结束语

综上所述,养殖过程中加强对各类胃部系统疾病的治疗,对其健康生长有非常重要的作用,作为养殖人员需要加强对于羊舍的清洁以及羊养殖的合理管理,确保其健康生长。

参考文献:

- [1] 司马义·艾沙,依买尔·达古提.几种常见羔羊胃肠疾病的防治[J].农家致富顾问,2019(6):51-51.
- [2] 鹿伍.肉羊疾病治疗中的几种常用注射方法[J].畜牧兽医学(电子版),2018,000(003):107.
- [3] 戴丽丽.肉羊疾病治疗中的几种常用注射方法[J].畜牧兽医学(电子版),2018.
- [4] 李学琴.几种常见羔羊胃肠疾病的防治应用[J].农家致富顾问,2020,000(006):103.
- [5] 万玛措.几种常见羔羊胃肠疾病的防治探究[J].农家致富顾问,2019,000(018):104.